

Ukázka testových otázek

(klinické předměty (gynekologie, porodnictví, neonatologie), porodní asistence, psychologie)

pro přijímací řízení ve studijním programu: Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče

Správné odpovědi jsou uvedeny za testem.

- 1. V případě zvýšených jaterních testů ve druhé polovině gravidity je nutné myslet především na**
 - a) hepatitidu A
 - b) jaterní cirhózu
 - c) HELLP syndrom
 - d) hepatitidu B
- 2. Turnerův syndrom má genotyp**
 - a) 45 XX
 - b) 46 X0
 - c) 45 X0
 - d) 46 XY
- 3. Kolpokleisis je operace vhodná u pacientky s**
 - a) inkontinencí moče
 - b) onemocněním děložního čípku
 - c) myomem děložním
 - d) prolapsem dělohy
- 4. 1. fáze Pawlikova hmatu zjišťuje**
 - a) přímý průměr pánevního východu
 - b) příčný průměr pánevního vchodu
 - c) obsah dolního děložního segmentu
 - d) obsah fundu děložního
- 5. Deflexní poloha plodu není poloha**
 - a) záhlavím
 - b) předhlavím
 - c) čelní
 - d) obličejová
- 6. Tokolytická léčba je kontraindikována při**
 - a) poloze plodu koncem pánevním
 - b) pokročilém vaginálním nálezu
 - c) vícečetném těhotenství
 - d) uložení plodu v poloze podélné záhlavím
- 7. Nejčastější puerperální infekcí je**
 - a) mastitis abscedens
 - b) endomyometritida
 - c) adnexitida
 - d) pyelonefritida

8. Kardiopulmonální resuscitaci u novorozence provádíme v poměru

- a) 15:2 (komprese/vdech)
- b) 3:1 (komprese/vdech)
- c) 15:2 (vdech/komprese)
- d) 3:1 (vdech/komprese)

9. Označte pravdivé

- a) plod tvoří moč od 20. týdne gravidity
- b) plná funkčnost ledvin u dětí nastává od 3. měsíce života
- c) diuréza u novorozence je 1 – 2 ml/kg/h
- d) diuréza u novorozence je 8 – 10 ml/kg/h

10. Označte neplatící

- a) primární bilirubin se váže na albumin, je rozpustný ve vodě a je vylučován močí a stolicí
- b) nekonjugovaný bilirubin se váže na albumin, je nerozpustný ve vodě a je vychytáván v játrech
- c) sekundární bilirubin se nevyskytuje v krvi zdravého člověka
- d) přímý bilirubin se váže na kyselinu glukuronovou a je ve vodě rozpustný

11. Budinův hmat hodnotí

- a) tvar dělohy
- b) sklon krční rýhy
- c) uložení hřbetu a malých částí plodu v děložních hranách
- d) dolní děložní segment

12. Učebnici pro porodní babičky „Úvod k babení“ napsal

- a) Václav Rubeška
- b) František Mošner
- c) Antonín Jungmann
- d) Jan Streng

13. Prvorodička obvykle cítí pohyby

- a) od 20. týdne gravidity
- b) od 22. týdne gravidity
- c) od 18. týdne gravidity
- d) od 19. týdne gravidity

14. Mezinárodní den porodních asistentek je

- a) 15. března
- b) 5. dubna
- c) 5. května
- d) 15. května

15. V pupečníku jsou obvykle

- a) 2 arterie a 1 vena
- b) 2 vény a 2 arterie
- c) 1 vena a 1 arterie
- d) 2 vény a 1 arterie

16. S. Freud vysvětluje psychický vývoj na základě

- a) pudů
- b) nevědomých protipřenosů
- c) vývojových stupňů
- d) nenávisti ve vztazích

17. Separační úzkost se objevuje

- a) ve 4. měsíci života
- b) v 6. měsíci života
- c) v 7. měsíci života
- d) ve 2. roce života

18. „Flashbacks“ jsou

- a) příznakem hospitalismu u dětí
- b) suicidální myšlenky
- c) epizody znovuprožívání traumatu
- d) záchvatovitá zrudnutí způsobená antihypertenzivou

19. Základní složkou myšlení je

- a) dojem
- b) pojem
- c) vjem
- d) vhled

20. Mezi psychické potřeby nemocného dítěte v mladším školním věku nepatří potřeba

- a) orientovat se ve své nemoci
- b) otevřené budoucnosti
- c) seberealizace
- d) stigmatizace

Správné odpovědi:

1c; 2c; 3d; 4c; 5a; 6b; 7b; 8b; 9c; 10a; 11; 12c; 13a; 14c; 15a; 16a; 17c; 18c; 19b; 20d.